

Porođajne smetnje i zapreke porođaja od strane ploda

Vrsta: Matarski | Broj strana: 10 | Nivo: Srednja poljoprivredna škola

Ovo je pregled **DELA TEKSTA** rada na temu "**Porođajne smetnje i zapreke porodaja od strane ploda**". Rad ima **10 strana**. Ovde je prikazano **oko 500 reči** izdvojenih iz rada.

**Napomena:** Rad koji dobivate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo **deo teksta** izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

REPUBLIKA SRBIJA

Poljoprivredna Škola Radoš Jovanović Selja

MATURSKI RAD

iz

porodiljstva

POROĐAJNE SMETNJE I ZAPREKE POROĐAJA

OD STRANE PLODA

Prokuplje, maj 2010.

SADRŽAJ:

*** UTICAJ GRAVIDITETA NA ORGANIZAM ŽENKE.....	str.3
*** PATOLOŠKA MNOGOPLODНОСТ.....	str.4
*** OSNOVNA ZNANJA O POROĐAJU.....	str.5
*** VANMATERIČNA TRUDНОĆА.....	str.6
*** SPONTANI I PONAVLJANI POBAČAJ.....	str.7
***UVRTANJE I IZVALA MATERICE NAKON PORDA.....	str.9
***LITERATURA.....	str.10

#### UTICAJ GRAVIDITETA NA ORGANIZAM ŽENKE

Graviditet ( bremenitost ) je fiziološko stanje koje zdrava ženka normalno podnosi bez većih teškoća. Uprkos tome što postavlja velike zahteve organizmu, graviditet čak deluje i pozitivno na neke životne procese. Mena procesa kod gravidne ženke je veoma intenzivna, jer za razvoj ploda ( plodova ) treba puno više energije i hranjivih materija nego kod negravidnih ženki, pa zbog toga ženke tokom graviditeta imaju pojačan apetit, što se ogleda i na njihovo gojno stanje. U prvoj polovini graviditeta, plod još ne treba mnogo hranjivih materija i u tom razdoblju organizam ženke sakuplja zalihe za drugu polovinu bremenitosti, kada se on kudikamo intenzivnije razvija i raste, a samim time su i njegove potrebe za hranjivim materijama i energijom veće. Usled povećanja telesne mase, gravidne ženke postaju mirnije i tromije, te se brže umaraju prilikom telesne aktivnosti. U kasnijem graviditetu dlaka slabije raste , pa čak i pojačano opada. Telesna temperatura gravidne ženke je nešto povišena, što je takođe posledica intenzivnijeg metabolizma. Osim povećanja intenziteta mene procesa, dolazi i do funkcionalnih promena u pojedinim organskim strukturama. Povećana je količina krvi u opticaju, kao i sposobnost njenog grušanja. Pred kraj bremenitosti raste u krvi broj belih krvnih zrnaca određenog tipa, što povećava odbrambene mogućnosti organizma prema infekcijama. Zbog pritiska materice na dijafragmu, te povećane potrebe ploda za kiseonikom, disanje postaje frekventnije. Kako materica s plodovima postaje sve veća, menja se i položaj i međusobni odnos organa u trbušnoj šupljini. Mokrenje i defeciranje postaju učestaliji. Ukoliko ženka hranom dobija dovoljno vitamina, minerala i hranjivih materija, koštani sastav ženke ne trpi nikakve štete, nego se on još bolje razvija ( posebno kosti karlice ) Isto tako se , naročito u drugoj polovini bremenitosti, intenzivno razvija i mlečna žlezda. Sve dosad navedeno vredi za organizam zdrave i pravilno hranjene ženke. Nepravilna ishrana i držanje ili razne bolesti, negativno utiču na tok graviditeta i na razvoj ploda, kao i na životnu sposobnost i vitalnost mladunčeta, a to može rezultirati

pobačajem, preranim porodom, mrtvorodenošću, avitalnom mladunčadi , te ozbiljnim poremećajima zdravlja ženke ili njenim uginućem.

Porođajni stres

Porođaj je za majku fizički i psihički stres. Taj stres može biti normalan, bez vegetativnih posledica, EUSTRES u prilici kad egzogene stresne situacije nisu prejake, a njezine odbrambene sposobnosti normalne. Ako egzogeni stres dolazi zbog nepravilnog odravanja bremenitosti ili nekih trauma tokom tog perioda i endogeni stres do kojeg dođe zbog različitih patološkim situacija ili čak bolesnih ženki DISTRES, može doći do značajnih smetnji u toku porođaja.

...

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD  
MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. -----**

**www.maturskiradovi.net**

**MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:**

**maturskiradovi.net@gmail.com**