

## Polovo prenosivi infekcii (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10

### СЕКС ?????

Сексуален однос ( коитус ) - телесно соединување на сексуалните партнери заради задоволување на сексуалната желба.

Видови: вагинален ( вагина-пенис ), анален ( пенис-анален отвор, чмар) и орален ( уста-пенис, уста -вагина)

А што нè прави сексуално активни?

Желбата за секс - либидо - резултат на лачење на полови хормони во период на пубертет

Пубертет- период на психичко и полово созревање на личноста; кај девојчиња од 10-15год., кај момчиња од 12-17год.

Полови хормони - супстанции кои се лачат од машки и женски полови жлезди ( тестиси т.е јајници ) заради Што се разликуваат машки и женски полови карактеристики.

Полови ( сексуални ) карактеристики - телесни промени по кои се разликуваат машки и женски особи, а се резултат на половите хормони (женски: дојки, менструација, влакнатост под пазуви и на гениталии, женска конституција на тело; машки: задебелување на глас, влакна на гениталии, под пазуви, брада, мустаќи, пораст на пенис и тестиси, атлетска градба на тело и сл. )

Полови органи - делови на телото; генетски предодредени машки или женски; внатрешни и надворешни.

СЕКС . . . а зошто ???

" Репродукција на видот - имање потомство ( деца )

" Добро здравје

" Хормонска рамнотежа

" Психичка смиреност

" Задоволство

" Израз на чувства меѓу партнерите

" Заради. . .

Да сексот ни е потребен!!!.

Но помислуваш ли дека и сексот може да има нескани последици????

Сепак. . .

што, како...

ППИ- полово преносливи инфекции - заразни заболувања кои се пренесуваат по сексуален пат. ( уште познати како сексуално преносливи инфекции т.е венерични болести )

Зошто...

Статистиките покажуваат дека младите кои се сексуално активни се најповеќе изложени на ризик да добијат ППИ од било која друга возрасна група.

Како се пренесуваат полово преносливи инфекции?

- Незаштитен сексуален однос со инфициран партнер;

- Директен контакт со инфицираното место;

- Од заразена бремена жена на плодот ( во тек на бременост, породувањеили доење);

- Крвен контакт: употреба на веќе користени игли, шприцеви при интравенско користење дрога, тетовирање, пирсинг и сл.

Може ли да се препознаат ?

Симптоми како:

- " Необичен исцедок од пенис/вагина со непријатен мирис, густина, боја;
- " Печење, болка, често мокрење;
- " Болка при сексуален однос;
- " Црвенило, исип, чешање околу гениталии;
- " Нарушено менструално крварење

Треба да бидат причина за консултација со лекар ( матичен лекар, гинеколог, дерматовенеролог или уролог)

Многу ППИ честопати не даваат никакви симптоми - може да си инфициран и да ја пренесуваш инфекцијата на секс.партнер и без да знаеш!

Кои се последиците ако не се лекуваат?

- Намалена плодност до стерилитет ( неможност за создавање потомство )
- Отежната бременост , спонтани абортуси, мртвородено;
- Пренесување на инфекцијата на новороденото;
- Зголемен ризик за појава на рак на гло на матка;

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE  
PREUZETI NA SAJTU. -----**

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

**MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)**