

## VOVED

Se smeta deka depresivnite pacienti ne se za individualna psihoanalitiċka psihoterapija.Vo faza na depresivna psihoza ovie pacienti ne gi ispolnuvaat nitu osnovnite uslovi za zapoċnuvanje na psihoterapija.Tie ne moċat da vospostavat nitu da odrċuvaat bilo kakvi osmisleni objektivni odnosi.Vo poblagi depresii razvivaat zavisni regresivni transversni odnosi.Depresivniot pacient se sklioni na suicid moċe da pokaċuva izrazito neprijateljstvo niz zavisen transfer ili da manifestirairacionalen bes.

Za zavisnost na depresivnite se misli na postojana potreba da dobivaat gratifikacija na dominacija nad drugite,bidejċi odrċuvaat sopstveno samopoċitivanje.Zavisnosta i simptomi im sluċat za manipuliranje na drugite pa i na samiot terapevt.Pritoa koristat pasivni tehniki so koi predizvikuvaat soċaluvanje i da privleċat vnanie.So pojavuvanje na histeriċni obeleċja odnesuvanjeto stanuva dramaturgizirano i agresivno. Sozrevanjeto i steknuvanje na uvid se moċni samo preku dobro podnesuvanje na depresija i narcistiċki povredi.Vo tekot na psihoanaliza depresivnite raspoloċenija se neizbeċni.Pa zatoa vo psihoanaliza kaj depresivnite pacienti stalno e prisutna opasnost od vlošuvanje na na depresija, pa i suicidnost.

Arieti preporaċuva da vo sluċai kade pacientite postavuvaat baranja vo poċetokot na tretman se izleze vo presret na baranjata,a vo sluċaj kade pacientot sam sebe se osuċuva deluva na stavovite dominantni nad drugite.Duri posle podobrivanje na na depresija moċe da se pristapi na voobiċaena tehnika na individualna psihoterapija.

Kamer smeta deka vo psihoterapija na depresivnite moċat da koristat: emocionalna potpora, rasteretini vo vid na katarza ili ispoved,usmeruvanje koga pacientot ne moċe da se odluċi, sugestija, objasnuvanje, biheviorna terapija i manipuliranje so okolinata.Isti tehniki moċat da se koristat vo psihoterapija vo grupa od 4 do 10 pacienti.Depresivnite pacienti treba da izbegnuvaat sovremeni grupni proceduri koi baraat visoko emocionalno uċestvo. Sekoja grupa vo odreċen moment mora da se sooċi so problemot i rešavanje na problem na gubitok, taguvanje i smrt. Za grupata depresijata ċesto e pobolen efekt i od anksioznost. Dax i Semrad naveduva deka za grupata e mnogu teŃko da se sedi i posmatra nekogo koj plaċe ili oċajuva.

Frederik i Ferberou doaċat do grupna psihoterapija na depresivni niz ambulantna grupa na psihoterapija na suicidnite.Preporaċuvaat odreċen dijagnostiċki sostav na grupata, pri Ńto depresivnite pacienti se otfrlaat na nov nacin.Se iskluċuvaat od grupata endogeni tipovi na depresija i psihotiċno depresivni pacienti.Se preporaċuva grupata da ja soċinuvaat 4-5 neurozi,1-2 depresii,1 psihopatija.Ne e preporaċljivo vo grupata da ima poveċe od dvajca depresivni pacienti zatoa sto tie moċat da dejstuvuvaat depresivno na celata grupa,a i moċat da imaat mnogu baranja.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOċETE PREUZETI NA SAJTU. -----**

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

**MOċETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)**